İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı	Antepfıstığı karazenk (*Pseudocercospora pistacina*)	500 g/100 L su	21 gün
Armut	Armut karalekesi (*Venturia pirina*)	800 g/100 L su dal sıracası varsa 400 g/100 L su dal sıracası yoksa	21 gün
	Armut memeli pası (*Gymnosporangium fuscum*)	400 g/100 L su	21 gün
Aspir	Aspir yaprak lekesi (*Alternaria carthami*)	300 g/100 L su	14 gün
Bağ*	Mildiyö (*Plasmopara viticola*)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
	Antraknoz (*Elsinoe ampelina*)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
Domates	Mildiyö** (*Phytophthora infestans*)	300 g/100 L su	14 gün
	Domateste bakteriyel benek (*Pseudomonas syringae* pv. *tomato*)	300 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
	Bakteriyel leke (*Xanthomonas vesicatoria*)	300 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
Domates, Patlıcan, Patates	Erken yaprak yanıklığı (*Alternaria solani*)	500 gr / 100 lt su	14 gün
Elma	Elma karalekesi (*Venturia inaequalis*)	800 g/100 L su dal sıracası varsa 400 g/100 L su dal sıracası yoksa	21 gün
Erik	Eriklerde cep hastalığı (*Taphrina pruni*)	800 g/100 L su	21 gün
Fasulye	Fasulye antraknoz (*Colletotrichum lindemuthianum*)	500 g/100 L su	14 gün
	Fasulye adi yaprak yanıklığı (*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli*)	300 g/100 L su	14 gün
	Fasulye hale yanıklığı (*Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola*)	300 g/100 L su	14 gün
Hıyar (Tarla), Kornişon	Köşeli yaprak leke hastalığı (*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*)	300 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)	400 g / 100 lt su (Normal Dönem) , 800 g / 100 lt su (Dormant dönem)	21 gün
Patates	Mildiyö (*Phytophthora infestans*)	300 g/100 L su	14 gün
Sebze fideleri	Çökerten ve kök çürüklüğü (*Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Sclerotinia* spp., *Phytophthora* spp.)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama (fidelik uygulaması)	14 gün
Şeftali	Yaprak delen (Çil) (*Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila*)	800 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
	Şeftali yaprak kıvırcıklığı (*Taphrina deformans*)	800 g/100 L su	21 gün
Şerbetçiotu	Şerbetçiotu mildiyösü (*Pseudoperonospora humuli*)	500 g/100 L su	14 gün
Turunçgiller	Turunçgillerde uç kurutan (*Phoma tracheiphila*)	400 g/100 L su	21 gün
Tütün	Çökerten hastalığı (*Rhizoctonia solani*, *Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Alternaria* spp., *Sclerotinia sclerotium*)	400 g/100 L su	14 gün
Yerfıstığı	Yaprak lekesi (*Cercospora arachidicola*)	400 g/100 L su	14 gün
Zeytin	Halkalı leke (*Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum*)	400 g/100 L su	21 gün

TİM PLANT CARE TARIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

THUMPER

ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Yutulması sonucunda hastada kusma, bayılma, hipokalemi ve kanda üre yükselmesine neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Şüphe durumunda veya belirtiler olması durumunda bir doktora başvurun ve bu belgeyi gösterin.
Daha ciddi semptomların görülmesi durumunda, acil tıbbi yardım talep ediniz.
GÖZLERLE TEMAS: Durumun kontak lenslerin (mevcut ise) kolaylıkla çıkarılmasına elverişli olması halinde, lensleri çıkarınız. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Tıbbi tavsiye / yardım alın.
CİLTLE TEMAS: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Hemen akan su ile (ve mümkünse sabunla) tamamen yıkayın. Tıbbi tavsiye alın. Kirlenmiş giysilerle daha fazla temas etmekten kaçınınız.
YUTMA: Bir doktor tarafından açıkça izin verilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kişi bilincini kaybetmiş ise, ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Tıbbi tavsiye / yardım alın.
SOLUNUM: Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Tıbbi tavsiye / yardım alın.

24 Eylül 2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Yasemin HACIALİOĞLU
Daire Başkanı V.

NET MİKTARI (kg) :
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:
Bakır oksiklorid

ZARARLILIK İŞARETİ:

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H302: Yutulduğunda zararlıdır.
H332: Solunduğunda zararlıdır.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru/hekimi arayın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Isı, ateş ve nemden uzakta depolayınız. Fiziksel ve ısı hasarlarından koruyunuz.
- Metalik kaplarda depolamayınız.

TİM PLANT CARE TARIM San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0398062656600015 Tic. Sic. No: 3435
Adres: 5 Eylül Mh. Milli Egemenlik Cd. No: 43/A
Alsancak/MANİSA Tel: 0 236 653 10 60 0 232 478 17 77
Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.**
**Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla enfazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
İlaç normu: Domates tarlalarındaki hastalık ilaçlamalarında ilaç normu 30-60L/da olarak önerilmektedir

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Antepfıstığında Karazenk
1. uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.
2. uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.
Armut Karalekesi
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.
Armut Memelipası
1. uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
2. uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90'ı döküldüğü zaman,
Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.
Aspir Yaprak Lekesi
Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.
Bağ Mildiyösü
1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.
Bağ Antraknozu
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.
Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.
1. uygulama: Sürgünler 5-10 cm,
2. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.
Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.
Domates Mildiyösü
Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16ºC ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır, Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

TİM PLANT CARE TARIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ

THUMPER

ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ
Parikh Enterprises Pvt. Ltd.
Plot No. 442, GIDC Odhav, Ahmedabad382415, Gujarat, HİNDİSTAN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
TİM PLANT CARE TARIM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.,
Beşeylül Mah. Milli Egemenlik Cad. No:43/A Alaşehir-MANİSA

TİM PLANT CARE TARIM San. ve Tic. Ltd. Şti.
Durmuş DEMİREL
Şirket Yetkilisi

24 Eylül 2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yasemin KAÇAL OĞLU
Daire Başkanı V.

Domateste Bakteriyel Benek
Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates Bakteriyel Leke
Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan ve Patateste Erken Yaprak Yanıklığı
Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulanmaya devam edilir.

Elma Karalekesi
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün ara ile uygulanmalıdır.

Eriklerde Cep Hastalığı
1. uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Fasulye Antraknozu
Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde günlük ortalama sıcaklığın 17-23ºC olduğu orantılı nemin %92'nin üstüne çıktığı dönemde tarla kontrolleri yapılır ve yörede ilk belirtilerin gorülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. İlaçlamada bitkinin tüm yeşil aksamın ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı ve Hale Yanıklığı
Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Hıyar-Kornişon Köşeli Yaprak Lekesi
Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü
Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16ºC veya en düşük sıcaklığın 10ºC'yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü
Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.
Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.
Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı, Şeftali)
1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı
1. uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Şerbetçiotu Mildiyösü
İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10'ar gün aralıklarla devam edilir.

Turunçgillerde Uç Kurutan
Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.
Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Tütün Fidelerinde Çökerten
Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Yerfıstığında Serkospora Erken Yaprak Lekesi
Birinci ilaçlama ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır, hasatla son ilaçlama arasındaki süre dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir.

TİM PLANT CARE TARIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ

THUMPER

ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TİM PLANT CARE TARIM San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0950052866600015 Tic. Sic. No: 3435
Adres: 5 Eylül Mh. Milli Egemenlik Cd. No: 43/A
Alaşehir/MANİSA Tel: 0 236 653 18 60 0 232 478 17 77
Mersis V.D. No: 908 052 8666
Durmuş DEMİREL
Şirket Yetkili

24 Eylül 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yasemin HAC...
Daire Başkanı V.

Zeytinlerde Halkalı Leke
Marmara Bölgesinde:
1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege Bölgesinde:
1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz Bölgesinde:
1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
Tüm ilaçlamalar yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Genel kullanım tavsiyesi olarak yağış durumuna göre 7-14 gün aralıklar ile bir sezonda en fazla 5 uygulama yapınız.

THUMPER hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
THUMPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **THUMPER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.

TİM PLANT CARE TARIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ

THUMPER

ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TİM PLANT CARE TARIM San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0998082886600015 Tic. Sic. No: 3435
Adres: 5 Eylul Mh. Milli Egemenlik Cd. No: 43/A
Alaşehir/MANİSA Tel: 0 236 653 10 60 0 232 478 17 77
Mesir V.D. No: 998 082 8866

Durmuş DEMİREL
Şirket Yetkili

T.C.
Yasemin HABİALİOĞLU
Daire Başkanı V.

24 Eylül 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR